


## QUICK TIPS

# EHBO E-BOEKJE VOOR ACUTE SPIJSVERTERINGSKLACHTEN BIJ DE HOND



# 01

## NAAR DE DIERENARTS:

- Overgeven (aanhoudend)
- Diarree (aanhoudend) of waterdun
- Diarree bij een pup
- Koorts vanaf 39,5 C
- Afwijkende ontlasting: slijm, zwart, rood
- Lekken van ontlasting
- Bloed bij urine
- Benauwdheid
- Tekenen van een maagtorsie
- Erg afwijkend gedrag, zoals verward zijn, wankelen of in elkaar zakken
- Plotseling hevig janken of piepen
- Bij twijfel!

# 02

## BASIS RECEPT VOLWASSEN HOND BIJ **ACUTE DIARREE** OF ANDERE SPIJSVERTERINGSKLACHTEN

NA **12-24 UUR** VASTEN  
MAX **2-3** DAGEN

DIT GEEF JE ALLEEN ALS DE  
HOND HEEL ZIEK IS.

GEEF KLEINE BEETJES VAN  
DEZE LICHT VERTEERBARE  
VOEDING.

BOUW WEER RUSTIG OP  
NAAR DE EIGEN VOEDING

Per kg lichaamsgewicht

- 20 gram gekookt of gestoomd vlees van een nieuwe eiwitbron, bv kalkoen, konijn of witvis
- 10 gram gekookte pompoen

# 03

## DR. MORO'S WORTEL SOEP BIJ MAAG/DARMKLACHTEN

### RECEPT:

- 500 GR WORTELEN WASSEN EN IN KLEINE STUKJES SNIJDEN
- WORTELEN IN 1 LITER WATER AAN DE KOOK BRENGEN
- DEZE SOEP MOET MINIMAAL 1,5 UUR KOKEN!
- PUREER DE SOEP MET EEN MIXER
- VUL DE SOEP AAN MET GEKOOKT WATER TOT JE WEER 1 LITER TOTAAL HEBT
- DE SOEP MOET EEN WAT DIKKERE CONSISTENTIE HEBBEN, NIET TE WATERIG
- VOEG 1 THEELEPEL ZEEZOUT TOE (MINERALEN)

### Gebruik:

4-5 keer per dag een portie soep geven in plaats van het eigen voer  
Na 2e of 3e dag afwisselend soep en eigen voer geven  
De soep moet 30 minuten voor het eigen voer gegeven worden.

### Hoeveelheid:

Tot 5 kg: 150 - 200 ml  
Tot 10 kg: 300 - 400 ml  
Tot 20 kg: 600 - 800 ml  
Tot 30 kg: 900 - 1200 ml  
Meer dan 30 kg: naar behoefte

### HIER KAN JE EEN KLEIN BEETJE HEEMST, DILLE OF AAN TOEVOEGEN:

HEEMST: SLIJMSTOFFEN OM DE DARMWAND TE ONDERSTEUNEN

DILLE: VERBETERT DARMBEWEGINGEN + PRODUCTIE ENZYMEN EN GAL

RODE IEP POEDER: SLIJMSTOFFEN OMHULLEN DE MAAGSLIJMVLIEZEN

[JOKE SAUERBREIJ@GMAIL.COM](mailto:JOKE SAUERBREIJ@GMAIL.COM)

# LACTOBACILLUS RHAMNOSUS

**L. RHAMNOSUS: KAN SAMEN MET ANTIBIOTICA GEGEVEN WORDEN.**

- **BEVORDERT DE OVERLEVING VAN DE DARMEPITHEELCELLEN.**
- **HEEFT EEN VERHOOGEND EFFECT OP DE PRODUCTIE VAN BUTYRAAT.**
- **ONDERSTEUNT COLONCELLEN OM DE REGELMAAT TE BEHOUDEN EN DE BLOEDSTROOM TE VERBETEREN.**
- **HEEFT ONDER MEER EEN ANTIMICROBIËLE ACTIVITEIT TEGEN SALMONELLA.**

## **DOSERING PROCANICARE:**

- **1 TOT 3 KG: 1 GRAM = 0,5 THEELEPEL**
- **>3 KG 2 GRAM = 1 THEELEPEL**

**JOKE SAUERBREIJ@GMAIL.COM**

**WWW.ADVIESVOORJEHOND.NL**